



Landesinstitut für Statistik

Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1 • 39100 Bozen
Tel. 0471 41 84 00 • Fax 0471 41 84 19<https://astat.provinz.bz.it>
astat@provinz.bz.it

Istituto provinciale di statistica

Via Canonico Michael Gamper 1 • 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 84 00 • Fax 0471 41 84 19<https://astat.provincia.bz.it>
astat@provincia.bz.it

25

Juni
Giugno
2023

astat info

Freiwillige Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten - 2022

Interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei - 2022

Auf einen Blick:
A colpo d'occhio:**521**

Schwangerschaftsabbrüche

interruzioni volontarie di gravidanza

36,5%

pharmakologische Schwangerschaftsabbrüche

interruzioni volontarie di gravidanza farmacologiche

83,7%

Gynäkologen/innen verweigern Abbrüche aus Gewissensgründen

ginecologhe e ginecologi obiettori di coscienza

503

Fehlgeburten

aborti spontanei

Im Jahr 2022 wurden in Südtirol 5,5% mehr freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt als im Vorjahr. Ungefähr ein Drittel der betroffenen Frauen sind Ausländerinnen. Die Fehlgeburten haben im Bezugsjahr um 4,2% abgenommen. Bei einer Fehlgeburt sind die Frauen durchschnittlich 33,3 Jahre alt.

Nel 2022 le interruzioni volontarie di gravidanza in Alto Adige erano 5,5% in più rispetto all'anno precedente. Circa un terzo delle donne interessate sono straniere. Gli aborti spontanei sono diminuiti del 4,2%. L'età media della donna al momento dell'aborto spontaneo è di 33,3 anni.


Graf. 1

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten - 2002-2022

Werte je 1.000 Lebendgeborene

Interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei effettuati in provincia di Bolzano - 2002-2022

Valori ogni 1.000 nati vivi



© astat 2023 - sr



Freiwillige Schwangerschaftsabbrüche

Im Jahr 2022 wurden in den Gesundheitseinrichtungen Südtirols 521 freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das entspricht einer Zunahme von 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Mehr als neun von zehn der betroffenen Frauen sind im Land ansässig. Die Abbruchziffer, ein verlässlicher Indikator, um die Entwicklung des Phänomens korrekt zu bewerten, beträgt im Bezugsjahr 4,7 je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre). Diese ist im Vergleich zum Jahr 1980, als dieser Wert noch bei 7,1 lag, deutlich zurückgegangen. Auf gesamtstaatlicher Ebene beträgt die Abbruchziffer 5,4 (Quelle: Gesundheitsministerium 2020, letzte verfügbare Daten).

Mehr als ein Drittel der betroffenen Frauen sind Ausländerinnen

Die Abbruchziffer zeigt an, dass Ausländerinnen ungefähr viermal so häufig wie Inländerinnen eine Schwangerschaft freiwillig beenden (12,0 gegenüber 3,5 Abbrüche je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter).

Nach einem starken Anstieg in vergangener Zeit haben sich die Abbrüche bei den ausländischen Frauen stabilisiert und sind in den letzten Jahren tendenziell rückläufig. Im Jahr 2022 lag ihr Anteil an der Gesamtzahl der Schwangerschaftsabbrüche bei 35,7%, 2001 waren es 17,4%.

Interruzioni volontarie di gravidanza

Nelle strutture sanitarie della provincia di Bolzano nel 2022 sono stati praticati 521 interventi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), con un aumento del 5,5% rispetto al dato dell'anno precedente. Più di nove donne su dieci risiedono nel territorio provinciale. Il tasso di abortività, che rappresenta l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all'IVG, nel 2022 è risultato pari a 4,7 ogni 1.000 donne in età feconda (15-49 anni) con una sensibile riduzione rispetto al 7,1 del 1980. Il tasso di abortività a livello nazionale risulta pari a 5,4 (Fonte: Ministero della Salute 2020, ultimi dati disponibili).

Più di un terzo delle donne interessate sono straniere


Il tasso di abortività indica un ricorso all'IVG quasi quattro volte maggiore tra le donne con cittadinanza straniera rispetto a quello registrato tra le cittadine italiane, rispettivamente 12,0 e 3,5 interruzioni per 1.000 donne in età feconda.

Dopo un aumento importante nel tempo, le IVG tra le donne straniere si sono stabilizzate e, negli ultimi anni, hanno mostrato una tendenza alla diminuzione. Nel 2022 la loro quota raggiunge il 35,7% del totale delle IVG, nel 2001 era il 17,4%.

Graf. 2

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche nach Staatsbürgerschaftsgruppen der Frau - 2022
Prozentuelle Verteilung

Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate in provincia di Bolzano per gruppi di cittadinanza della donna - 2022
Composizione percentuale




In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche nach Staatsbürgerschaft der Frau - 2009-2022

Prozentuelle Verteilung

Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate in provincia di Bolzano per cittadinanza della donna - 2009-2022

Composizione percentuale



© astat 2023 - sr

**22,5% wiederholte Schwangerschaftsabbrüche**

Die Frauen, die in Südtirol eine gesetzlich erlaubte Abtreibung vornehmen lassen, sind größtenteils ledig (64,1%), 31,1% sind verheiratet und 4,8% getrennt oder geschieden.

Im Jahr 2022 sind 42,8% der Frauen zum Zeitpunkt des freiwilligen Schwangerschaftsabbruchs kinderlos, 16,7% haben bereits ein Kind und 40,5% mehr als eines. 22,5% geben an, vorher bereits mindestens einmal eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben, und 15,0% hatten zuvor mindestens eine Fehlgeburt.

Der Anteil der Schwangerschaftsabbrüche bei Ausländerinnen, die schon einmal abgetrieben haben, liegt bei 33,3% gegenüber 16,4% der Inländerinnen.

Mehr als eine von zehn der betroffenen Frauen ist über 40 Jahre alt

Die Datenauswertung nach Alter ergibt, dass die höchste Quote von Frauen, die einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, in die Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen fällt (43,6%), dicht gefolgt vom Anteil der Frauen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (43,0%). 10,4% der betroffenen Frauen sind mindestens 40 Jahre alt, während der Anteil der unter 18-Jährigen 3,1% ausmacht.

Im Jahr 2022 beträgt das Durchschnittsalter der Frauen mit italienischer Staatsbürgerschaft zum Zeitpunkt des Abbruchs 29,3 Jahre und jenes der Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft 31,4 Jahre.

22,5% di aborti volontari ripetuti

L'insieme delle donne che sono ricorse all'aborto legale in provincia di Bolzano è costituito prevalentemente da nubili, con una percentuale pari al 64,1% seguite dal 31,1% delle coniugate e dal 4,8% delle separate o divorziate.

Nel 2022 il 42,8% delle donne, al momento dell'interruzione volontaria di gravidanza, non aveva figli, mentre il 16,7% aveva un figlio ed il 40,5% più di uno. Il 22,5% ha dichiarato di aver interrotto in passato, almeno una volta, volontariamente la gravidanza ed il 15,0% di aver subito almeno un aborto spontaneo.

La percentuale di IVG effettuate da donne straniere con precedente esperienza abortiva è risultata pari al 33,3% contro il 16,4% di quelle italiane.

Più di una donna interessata su dieci ha oltre 40 anni

L'analisi dei dati per classe di età evidenzia un maggior ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza tra le donne in età compresa tra 30 e 39 anni (43,6%) seguite da quelle tra 18 e 29 anni (43,0%). Il 10,4% delle interruzioni volontarie di gravidanza riguarda donne di almeno 40 anni, mentre le donne con meno di 18 anni sono pari al 3,1%.


Nel 2022 l'età media della donna al momento dell'IVG si attesta a 29,3 anni per le italiane e 31,4 anni per le straniere.

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche nach Altersklasse und Staatsbürgerschaft der Frau - 2022

Prozentuelle Verteilung

Interruzioni volontarie di gravidanza in provincia di Bolzano per classe di età e cittadinanza della donna - 2022

Composizione percentuale



Abbruch meistens etwas vor der zehnten Schwangerschaftswoche

45,3% der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche werden bis zur achten Schwangerschaftswoche vorgenommen, 33,8% zwischen der neunten und zehnten Woche und 15,4% zwischen der elften und zwölften Schwangerschaftswoche.

5,6% der Fälle betreffen Abbrüche nach der zwölften Schwangerschaftswoche infolge eines pathologischen Befundes bei den Vorsorgeuntersuchungen von Mutter bzw. Kind.


IVG più frequenti sotto la decima settimana di gestazione

Il 45,3% delle interruzioni volontarie di gravidanza si è verificato entro l'ottava settimana di gestazione, mentre il 33,8% si è verificato tra la nona e la decima settimana e il 15,4% tra l'undicesima e la dodicesima settimana.

Il 5,6% dei casi riguarda gravidanze interrotte dopo la dodicesima settimana in seguito a risultati sfavorevoli delle analisi prenatali o per patologie materne.

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche nach Schwangerschaftswoche und Altersklasse der Frau - 2022

Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate in provincia di Bolzano per età gestazionale e classe di età della donna - 2022



Pharmakologische Eingriffe nehmen weiter zu

Aus einer Betrachtung der Wartezeiten geht hervor, dass 76,6% der Schwangerschaftsabbrüche innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der ärztlichen Bewilligung durchgeführt werden. In 94,6% der Fälle verstreichen nicht mehr als drei Wochen.

Meistens wird die ärztliche Bewilligung für den Schwangerschaftsabbruch vom gynäkologischen Dienst, der den Eingriff durchführt, erteilt (94,0%). Es folgen mit großem Abstand die Familienberatungsstelle (3,1%) und der Vertrauensarzt oder -ärztin (2,9%).

Die Dauer des Krankenhausaufenthaltes beträgt bei 94,8% der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche weniger als 24 Stunden. Die Absaugung ist nach wie vor die am häufigsten angewandte Methode (43,2%). Der Eingriff wird nun seltener unter Vollnarkose durchgeführt (61,4%).

Aus der Grafik 6 ist ersichtlich, wie sich die Abbruchziffer Italiens im internationalen Vergleich präsentiert. Da die Kennzahl auf internationaler Ebene pro Frau im Alter von 15-44 Jahren berechnet wird, wurde die Datenbasis für Italien entsprechend angepasst.

Ancora in aumento il ricorso all'intervento farmacologico

Sono in diminuzione i tempi di attesa tra il rilascio della certificazione e l'intervento; il 76,6% delle interruzioni volontarie di gravidanza risulta eseguito entro 14 giorni dalla certificazione e nel 94,6% dei casi, comunque, non oltre le tre settimane.

Quasi sempre la certificazione di autorizzazione all'intervento viene rilasciata dal servizio ostetrico-ginecologico che lo esegue (94,0%); seguono, con notevole distanza, il consultorio familiare (3,1%) ed il medico di fiducia (2,9%).

La quasi totalità degli interventi avviene in day hospital con degenza inferiore alle 24 ore (94,8% dei casi) e l'isterosuzione rappresenta la tecnica più utilizzata (43,2%). Si riduce al 61,4% il ricorso all'anestesia generale.

Per un confronto internazionale sono riportati nel grafico 6 il tasso di abortività italiano e gli ultimi dati disponibili di altri paesi. Poiché a livello internazionale il tasso di abortività è calcolato su donne di età 15-44 anni, il dato italiano è stato ricalcolato adeguando il denominatore.


Graf. 6

Abbruchziffer im internationalen Vergleich - 2016-2020

Je 1.000 Frauen im Alter von 15-44 Jahren

Tassi di abortività nel confronto internazionale - 2016-2020

Per 1.000 donne di età 15-44



© astat 2023 - sr



Im August 2020 beschloss das Gesundheitsministerium eine Aktualisierung der Leitlinien zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch im Hinblick auf die pharmakologische Interventionsmodalität durch die zweifache Verabreichung von Mifepriston (RU486) und Prostaglandin. Damit entfällt die Verpflichtung zum Kranken-

Nell'agosto 2020 il Ministero della Salute ha deliberato l'aggiornamento delle linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza per quanto riguarda la modalità d'intervento farmacologico mediante la doppia somministrazione di mifepristone (RU486) e prostaglandine. Decade pertanto l'obbligo del ricovero ordi-

hausaufenthalt ab dem Zeitpunkt der Einnahme des Medikaments bis zum Ende der Behandlung. Außerdem wird die Anwendung des Medikaments von der siebten bis zur neunten Schwangerschaftswoche verlängert. Der Einsatz erfolgte 2022 in 36,5% der Fälle gegenüber 23,9% im Jahr 2021 und 6,6% im Jahr 2020, um das Ansteckungsrisiko mit Covid in den Operationssälen der Krankenhäuser zu minimieren.

nario dal momento dell'assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso assistenziale. Inoltre, l'impiego del farmaco si estende dalla settima alla nona settimana di gravidanza. Nel 2022 la sua applicazione ha riguardato il 36,5% dei casi contro il 23,9% del 2021 ed il 6,6% del 2020, per ridurre i rischi da contagio Covid nelle sale operatorie delle strutture ospedaliere.

Tab. 1

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche - 2022

Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate in provincia di Bolzano - 2022

	Insgesamt Totale	Prozentuelle Verteilung Composizione percentuale	
Staatsbürgerschaft			Cittadinanza
Italienische Staatsbürgerschaft	335	64,3	Cittadinanza italiana
Ausländische Staatsbürgerschaft	186	35,7	Cittadinanza straniera
Familienstand			Stato civile
Ledig	334	64,1	Nubile
Verheiratet	162	31,1	Coniugata
Getrennt, geschieden oder verwitwet	25	4,8	Separata, divorziata o vedova
Studientitel			Titolo di studio
Kein Abschluss oder Grundschulabschluss	1	0,2	Nessuno o licenza di scuola elementare
Mittelschulabschluss	129	24,8	Licenza di scuola secondaria di I grado
Matura bzw. Oberschulabschluss	321	61,6	Diploma e maturità di scuola secondaria di II grado
Universitärer Abschluss	70	13,4	Titolo universitario
Altersklassen (Jahre)			Classi di età (anni)
Bis 19	40	7,7	Fino a 19
20-24	106	20,3	20-24
25-29	94	18,0	25-29
30-34	116	22,3	30-34
35-39	111	21,3	35-39
40 und mehr	54	10,4	40 e oltre
Ermächtigungsstelle			Autorizzazione rilasciata da
Familienberatung	16	3,1	Consultorio familiare
Vertrauensarzt/Vertrauensärztin	15	2,9	Medico di fiducia
Geburtshilfe und gynäkologischer Dienst der Krankenanstalten	490	94,0	Servizio ostetrico-ginecologico dell'Istituto di cura
Vorhergehende Fehlgeburten			Numero di aborti spontanei precedenti
0	443	85,0	0
1	59	11,3	1
2	15	2,9	2
3 und mehr	4	0,8	3 e oltre
Vorhergehende freiwillige Schwangerschaftsabbrüche			Numero di interruzioni volontarie precedenti
0	404	77,5	0
1	74	14,2	1
2	33	6,3	2
3 und mehr	10	1,9	3 e oltre
Zahl der vorherigen Lebendgeborenen			Numero di nati vivi precedenti
0	223	42,8	0
1	87	16,7	1
2	133	25,5	2
3	62	11,9	3
4 und mehr	16	3,1	4 e oltre
Dauer der Schwangerschaft (Wochen)			Settimane di gestazione
Bis 8	236	45,3	Fino a 8
9-10	176	33,8	9-10
11-12	80	15,4	11-12
13 und mehr	29	5,6	13 e oltre
Insgesamt	521	100,0	Totale

Quelle: ISTAT, ASTAT

Fonte: ISTAT, ASTAT

Aus dem Monitoring des Jahres 2022 über das Personal, das Schwangerschaftsabbrüche aus Gewissensgründen verweigert, geht hervor, dass 83,7% der Gynäkologen und Gynäkologinnen, die in Südtirols öffentlichen Krankenhäusern und Privatkliniken arbeiten, keine Abtreibungen vornehmen. Italienweit liegt der Anteil der Verweigerer bei insgesamt 64,6% (2020, letzte verfügbare Daten).

Dal monitoraggio sul personale obiettore di coscienza relativo all'anno 2022 è emerso che l'83,7% tra ginecologhe e ginecologi operanti presso le strutture ospedaliere pubbliche o private dell'Alto Adige risulta obiettore. In Italia nel 2020 (ultimo dato disponibile), la quota è complessivamente del 64,6%.

Fehlgeburten

Fehlgeburten nehmen wieder leicht ab

Im Jahr 2022 werden in Südtirol 503 Fehlgeburten, welche eine Einlieferung in eine öffentliche oder private Krankenanstalt erforderlich machten, verzeichnet. Das sind 4,2% weniger als im Vorjahr, als die Zahl bei 525 lag.

Die Abbruchziffer beträgt 4,6 Fehlgeburten je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre), wobei der Gesundheitsbezirk Brixen (7,2) landesweit die höchste Abbruchziffer verzeichnet. 28,8% der betroffenen Frauen sind Ausländerinnen.

Aborti spontanei

Leggera diminuzione degli aborti spontanei

Nel 2022 sono stati notificati 503 casi di aborto spontaneo nella provincia di Bolzano, per i quali si è reso necessario il ricovero in strutture ospedaliere pubbliche o private con un decremento percentuale del 4,2% rispetto all'anno precedente (525).

Il relativo tasso di abortività è pari a 4,6 aborti spontanei ogni 1.000 donne in età feconda (15-49 anni). Il tasso di abortività del comprensorio sanitario di Bressanone (7,2) è risultato il più alto della provincia. Il 28,8% dei casi ha riguardato donne con cittadinanza straniera.

Graf. 7

Abbruchziffer bei Fehlgeburten in Südtirols Krankenanstalten nach Gesundheitsbezirk - 2022

Tasso di abortività spontanea negli istituti di cura della provincia di Bolzano per distretto sanitario - 2022



© astat 2023 - sr



Durchschnittsalter der Frauen bei einer Fehlgeburt liegt bei etwa 33 Jahren

Das zunehmende Alter der Frauen zum Zeitpunkt der Empfängnis stellt den höchsten Risikofaktor für eine Fehlgeburt dar: So ist die Abbruchquote bei den Frauen ab einem Alter von 40 Jahren deutlich höher als in der Altersklasse der 35- bis 39-Jährigen (260,6 gegenüber 142,6 Fehlgeburten je 1.000 Lebendgebore-

L'età media delle donne al momento dell'aborto spontaneo è di circa 33 anni

L'innalzamento dell'età procreativa rappresenta il fattore di rischio più rilevante di abortività spontanea; ad esempio, il rapporto di abortività riferito alle donne di 40 anni e oltre risulta notevolmente superiore a quello della classe di età precedente 35-39 anni (260,6 contro 142,6 aborti spontanei per 1000 nati vivi). Il rischio di

ne). Bei den jüngsten Frauen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren beträgt die Fehlgeburtenrate 101,6‰, bei den 25- bis 29-Jährigen 67,6‰ und bei den 30- bis 34-Jährigen 79,3‰.


Im Jahr 2022 beträgt das Durchschnittsalter der Frauen bei einer Fehlgeburt 33,3 Jahre.

Die Abbruchziffer bei Fehlgeburten von ausländischen Frauen ist weit mehr als doppelt so hoch wie bei den Frauen mit italienischer Staatsbürgerschaft (9,3‰ gegenüber 3,8‰).

abortività spontanea delle più giovani tra 20 e 24 anni risulta pari a 101,6‰, quello delle classi di età 25-29 e 30-34 anni si attesta rispettivamente a 67,6‰ e 79,3‰.

Nel 2022 l'età media della donna al momento dell'aborto si attesta a 33,3 anni.

Inoltre, il tasso di abortività spontanea delle donne straniere risulta ampiamente il doppio rispetto a quello delle donne italiane, rispettivamente il 9,3‰ contro il 3,8‰.



Fehlgeburten um die zehnte Schwangerschaftswoche

Auch im Jahr 2022 bestätigt sich, dass Fehlgeburten meist in den ersten Schwangerschaftswochen auftreten: Tatsächlich konzentrierten sich 68,6% der Schwangerschaftsverluste auf die ersten zehn Schwangerschaftswochen. Die durchschnittliche Schwangerschaftszeit vor einer Fehlgeburt hält sich damit konstant bei 10,0 Wochen.

Der auf die Fehlgeburt folgende Eingriff machte in 83,7% der Fälle einen eintägigen Krankenhausaufenthalt erforderlich. Bei 65,2% der Fälle wird eine Auskratzung durchgeführt. Hoch bleibt auch der Anteil der Frauen, bei denen der Eingriff unter Vollnarkose durchgeführt wird (81,3%).

Aborti spontanei intorno alle dieci settimane di gestazione

Il fenomeno dell'abortività spontanea si caratterizza per una forte concentrazione degli eventi nelle prime settimane di gestazione. I dati del 2022 indicano, infatti, che il 68,6% delle gravidanze terminate precocemente per la morte del feto, è avvenuto nelle prime dieci settimane di gestazione. La durata media della gravidanza prima di un aborto spontaneo rimane quindi costante a 10,0 settimane.

L'intervento per aborto spontaneo ha richiesto nel 83,7% dei casi una giornata di ricovero. Il raschiamento rappresenta la tecnica più utilizzata (65,2%). Permane elevato il ricorso all'anestesia generale (81,3%).

Fehlgeburten in Südtirol - 2022

Aborti spontanei in provincia di Bolzano - 2022

	Insgesamt Totale	Prozentuelle Verteilung Composizione percentuale	
Staatsbürgerschaft			Cittadinanza
Italienische Staatsbürgerschaft	358	71,2	Cittadinanza italiana
Ausländische Staatsbürgerschaft	145	28,8	Cittadinanza straniera
Familienstand			Stato civile
Ledig	278	55,3	Nubile
Verheiratet	220	43,7	Coniugata
Getrennt oder geschieden	5	1,0	Separata o divorziata
Studientitel			Titolo di studio
Kein Abschluss oder Grundschulabschluss	5	1,0	Nessuno o licenza di scuola elementare
Mittelschulabschluss	167	33,2	Licenza di scuola secondaria di I grado
Matura bzw. Oberschulabschluss	236	46,9	Diploma e maturità di scuola secondaria di II grado
Universitärer Abschluss	95	18,9	Titolo universitario
Altersklassen (Jahre)			Classi di età (anni)
Bis 19	5	1,0	Fino a 19
20-24	38	7,6	20-24
25-29	88	17,5	25-29
30-34	149	29,6	30-34
35-39	149	29,6	35-39
40 und mehr	74	14,7	40 e oltre
Vorhergehende Fehlgeburten			Numero di aborti spontanei precedenti
0	354	70,4	0
1	100	19,9	1
2	36	7,2	2
3	11	2,2	3
4 und mehr	2	0,4	4 e oltre
Vorhergehende freiwillige Schwangerschaftsabbrüche			Numero di interruzioni volontarie precedenti
0	482	95,8	0
1	15	3,0	1
2	5	1,0	2
3 und mehr	1	0,2	3 e oltre
Zahl der vorherigen Lebendgeborenen			Numero di nati vivi precedenti
0	229	45,5	0
1	165	32,8	1
2	76	15,1	2
3	26	5,2	3
4 und mehr	7	1,4	4 e oltre
Dauer der Schwangerschaft (Wochen)			Settimane di gestazione
Bis 8	144	28,6	Fino a 8
9-10	201	40,0	9-10
11-12	108	21,5	11-12
13 und mehr	50	9,9	13 e oltre
Insgesamt	503	100,0	Totale

Quelle: ISTAT, ASTAT


Fonte: ISTAT, ASTAT

Fehlgeburten in Südtirols Krankenanstalten nach Schwangerschaftswoche - 2022

Prozentuelle Verteilung

Aborti spontanei registrati negli istituti di cura della provincia di Bolzano per numero di settimane di gestazione - 2022

Composizione percentuale



© astat 2023 - sr

**Glossar**

Abbruchziffer: das Verhältnis aus der Zahl der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche oder Fehlgeburten und der durchschnittlichen Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre), multipliziert mit 1.000.

Abbruchquote: das Verhältnis aus der Zahl der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche oder Fehlgeburten und der Zahl der Lebendgeborenen, multipliziert mit 1.000.

Hinweise für die Redaktion:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Emanuela Albanese, Tel. 0471 41 84 23,
E-Mail: emanuela.albanese@provinz.bz.it.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise - nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Verantwortlicher Direktor: Timon Gärtner

Glossario

Tasso di abortività: rapporto percentuale tra il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza o aborti spontanei e la popolazione media femminile in età feconda (15-49 anni), moltiplicato per 1.000.

Rapporto di abortività: rapporto percentuale tra il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza o aborti spontanei e i nati vivi, moltiplicato per 1.000.

Indicazioni per la redazione:

Per ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi a
Emanuela Albanese, tel. 0471 41 84 23,
e-mail: emanuela.albanese@provincia.bz.it.

Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione).

Direttore responsabile: Timon Gärtner